



ワクチン		種類	乳児期										幼児期						学童期／思春期									
			生直後	6週	2か月	3か月	4か月	5か月	6か月	7か月	8か月	9-11か月	12-15か月	16-17か月	18-23か月	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10歳以上				
インフルエンザ菌b型（ヒブ）	不活化				①	②	③						④（注1）															
肺炎球菌（PCV13）	不活化				①	②	③						④												(注2)			
B型肝炎 母子感染予防	ユニバーサル	不活化			①	②				③															(注3)			
	母子感染予防		①	②					③																			
ロタウイルス	1価	生			①	②			(注4)																			
	5価				①	②	③			(注5)																		
4種混合（DPT-IPV）	不活化				①	②		③					④（注6）			(7.5歳まで)												
3種混合（DPT）	不活化				①	②		③					④（注6）			(7.5歳まで)												
2種混合（DT）	不活化																							11歳 ①	12歳			
ポリオ（IPV）	不活化				①	②		③					④（注6）			(7.5歳まで)												
BCG	生					①																						
麻疹・風疹混合（MR）	生												①				② (注10)											
水痘	生												①		②									(注11)				
おたふくかぜ	生												①				② (注12)											
日本脳炎	不活化												① ②	③	(7.5歳まで)									④9-12歳				
インフルエンザ	不活化												毎年（10、11月などに）①②												13歳より①			
ヒトパピローマウイルス（HPV）	不活化																								小6	中1 ①②③ (注14)	中2～高1	

定期接種の
推奨期間

定期接種の
接種可能な期間

任意接種の
推奨期間

任意接種の
接種可能な期間

添付文書には記載されていないが
小児科学会として推奨する期間

健康保険での
接種時期